

Une étude de la personnalité d'adolescents consommateurs de drogue en Suisse romande

Michael OLEINIKOFF

Institut de médecine sociale et préventive, Rue César-Roux 16, 1005 Lausanne

Introduction

Une étude du profil des personnalités a été effectuée en 1974 par le Département de Psychiatrie Sociale, Institut Universitaire de Médecine Sociale et Préventive. L'échantillon est constitué d'un groupe de 30 jeunes consommateurs de drogue, venant d'un centre d'accueil "Drop'in", et d'un groupe de contrôle de 30 jeunes apprentis d'une importante usine lausannoise.

Nous avons utilisé la méthode MMPI par ordinateur.

L'évaluation a été faite en collaboration avec le service médical d'informatique de Hoffman-La Roche et ICAA.

Les objectifs ont été d'investiguer et de comparer les profils de personnalité des consommateurs de drogue avec un groupe de contrôle afin d'évaluer les différences psychologiques. Un intérêt particulier a été porté pour les échelles cliniques et spéciales indiquant un seuil de séduction plus bas et une plus grande vulnérabilité aux pressions sociales venant de groupes de référence ou autres. Les échelles cliniques sélectionnées pour cette analyse ont été : F, Hy, Pd, Sc et les échelles additionnelles ont été : Es, Sor, De, Re, St et Aut.

Hypothèses

Les adolescents consommateurs montreraient des profils de personnalité différents de ceux du groupe de contrôle. Ainsi, ou bien les profils montrent des différences notables ou bien les valeurs du groupe des consommateurs de drogue montreraient un profil semblable à celui du groupe de contrôle, mais à un degré nettement plus élevé atteignant le pathologique.

Certaines échelles spéciales indiqueraient une moins grande résistance aux pressions extérieures et un seuil de séduction plus bas, menant à une plus grande vulnérabilité à la persuasion chez les consommateurs de drogue.

Résultats

Le profil clinique moyen montrait une notable anormalité avec 6 échelles au-dessus de T = 70.

L'ensemble des valeurs les plus élevées étaient : 8 - 4 - 9, c'est-à-dire schizophrénie, déviance psychopathique et hypomanie, montrant ainsi des désordres de la conduite de type schizoïde avec des tendances psychopathiques.

Les échelles d'hypocondrie (70,0), d'hystérie (71,8) et de paranoïa (70,4) étaient élevées au-dessus de la valeur de 70 avec

l'échelle de phobie approchant de près cette valeur avec 68,9.

En addition, le groupe des consommateurs de drogue a montré des valeurs basses dans les échelles suivantes : force de Moi (35,0), dominance (41,1), responsabilité (35,0), statut social (46,8), désir d'approbation sociale (35,0) et intérêt religieux (38,7).

L'ensemble des valeurs les plus élevées pour le groupe de contrôle a été 9 - 4 - 3, mais avec le 8 atteignant une valeur pratiquement égale à l'échelle 3 (58,0 - 58,1). Cependant ces valeurs se sont trouvées sur un plan nettement inférieur aux valeurs du groupe des consommateurs.

Les valeurs obtenues dans le groupe de contrôle n'ont pas dépassé les niveaux de normalité pour aucune échelle clinique - la valeur la plus élevée a été 60,3 pour l'échelle d'hypomanie - et a montré des résultats beaucoup plus "normaux" dans les échelles spéciales.

Une comparaison entre la moyenne des profils cliniques des deux groupes montre une similarité intéressante dans les deux courbes. La courbe moyenne pour les toxicomanes apparaît comme une projection presque identique à la courbe du groupe de contrôle, mais sur une échelle beaucoup plus élevée, pour la plupart hors de la normalité 50 - 70. La seule différence étant 8 - 4 - 9 pour le profil des consommateurs contre 9 - 4 - 3 (8) pour le groupe de contrôle.

Remarques

L'aliénation, les tendances psycho et sociopathiques et les états de "border-line" schizophréniques suggérés par l'étude lausannoise ne devraient pas être interprétés comme des états typiques pour tous les consommateurs de drogue.

Ils représentent probablement plutôt l'extrémité d'une ligne continue incluant les consommateurs de drogue socialement intégrés, les pharmaco-dépendants ayant des profils de personnalité normaux et les alcooliques sociaux.

Bibliographie

HILL H.E., HAERTZEN C.A., GLASER R. "Personality characteristics of narcotic addicts as indicated by the MMPI" Journal of General Psychology 1960- 62,127,139.

BURKE E.H., EICHBERG R.H. "Personality characteristics of adolescent users of dangerous drugs as indicated by the MMPI", The Journal of Nervous and Mental disease.

Résumé

A personality profile study was undertaken with a group of 30 drug-users and a group control of 30 young non users using the MMPI.

Eine Typologie-Studie wurde aufgrund eines Musters von 30 Drogenbenützer und einer Kontrollgruppe von 30 jungen Lehrlingen durchgeführt.